

睡眠中の 赤ちゃんの死亡を 減らしましょう

SIDS対策
強化月間




乳 幼 児 突 然 死 症 候 群

睡眠中に赤ちゃんが死亡する乳幼児突然死症候群 (SIDS: Sudden Infant Death Syndrome) という病があります。

- SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気です。
- 平成30年には60名の乳幼児がSIDSで亡くなり、乳児期の死亡原因の第4位です。



乳幼児突然死症候群 (SIDS) について



SIDSの
発症率を低くする
3つのポイント



- 1 1歳になるまでは、
寝かせる時はあおむけに
寝かせましょう



- 2 できるだけ
母乳で育てましょう



- 3 たばこを
やめましょう

窒息事故防止のために ☆

睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群 (SIDS) のほか、窒息などによる事故があります。

- ☐ ベビーベッド に寝かせ、柵は常に上げて おきましょう
- ☐ 敷布団・マットレス・枕は固めのものを、
掛け布団は軽いものを 使いましょう
- ☐ 口や鼻を覆ったり、
首に巻き付くものは置かない ようにしましょう



厚生労働省



健やか親子21